



BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES



Boletín nº 16 / Logroño, 12 de diciembre de 2012

VIÑEDO

ENFERMEDADES FÚNGICAS DE MADERA (Complejo de hongos)

Los síntomas que manifiestan las cepas atacadas son muy parecidos a los que se les atribuía a las afectadas de **YESCA** (*Stereum hirsutum* y *Phellinus igniarius*) y/o **EUTIPIOSIS** (*Eutypa lata*). No obstante, en los análisis realizados en laboratorio se aislan otros hongos, principalmente: *Fomitiporia mediterranea*, *Botryosphaeria dothidea*, *Diplodia seriata*, *Neofussicoccum parvum*, *Stereum hirsutum*, *Eutypa lata*, *Phaemoniella chlamydospora*, *Phaeoacremonium aleophilum*, y *Cylindrocarpon sp.* Por ello, a partir de ahora las denominaremos como **“Enfermedades fúngicas de madera”**

Estas enfermedades de madera están presentes en los viñedos riojanos desde hace años y pueden afectar al tronco y a los brazos de la cepa. Las prospecciones realizadas en viñedos riojanos durante los últimos años nos indican que existe un importante porcentaje de cepas afectadas, principalmente en aquellos viñedos viejos donde se realizan cortes de poda gruesos.



Síntomas de yesca en hoja.

Por ello, en aquellas viñas donde sea necesario cortar brazos mediante la realización de grandes cortes de poda, debe tenerse en cuenta el riesgo que se corre frente a esta enfermedad. En plantaciones jóvenes, es recomendable proteger los cortes de poda gruesos desde el primer año.

Estrategia de lucha:

- podar con tiempo seco evitando las heridas gruesas, dejando transcurrir 4 días sin podar después de una lluvia o una nevada. Inmediatamente después de podar aplicar un producto protector sobre los cortes de poda:
 - con pincel: **tebuconazol+resinas sintéticas** (Tebuconazol pasta-Bayer CS)
- arrancar las cepas muertas, eliminar los brazos atacados y destruirlo todo.
- una cepa atacada puede regenerarse a partir de brotes bajos en el tronco (escardas) que hayan brotado de madera sana, cortando luego por encima de ellos.



Síntomas de eutypa en cepa con escarda a partir de la cual se puede regenerar de nuevo la cepa.

HERBICIDAS

A continuación se indican los productos a recomendar y que se pueden aplicar actualmente en viña:

Materia activa	Nombre y casa comercial
diflufenican + glifosato	Mohican Energy-Sapec; Trapio-Trade Corp; Zarpa-Bayer CS
diflufenican + oxifluorfen	Athabel-Problete
flazasulfuron + glifosato	TerraPack-Syngenta
flumioxazina	Pledge-KenoGard
isoxaben (*)	Rokenyl-Dow
orizalina (*)	Surflan-Dow
oxifluorfen	pr. común
oxifluorfen +glifosato	Laser plus-Afrasa
pendimetalin (*)	pr. común

Todas estas materias activas son residuales, y deben aplicarse con humedad suficiente en el terreno y antes de que broten la viña y las malas hierbas, o éstas se encuentren en estado de plántulas. Pero, si en el momento de realizar el tratamiento existen malas hierbas desarrolladas deben controlarse con (si no van incluidos en mezclas en el producto comercial):

Materia activa	Nombre y casa comercial
amitrol	pr. común
glifosato	pr. común
glufosinato amónico	Finale-Bayer CS
oxadiazon	Ronstar-Bayer CS

Los herbicidas son productos que deben utilizarse siguiendo estrictamente las indicaciones que figuran en la etiqueta del envase y las que pudiera proporcionar la casa comercial en cuanto a: dosis, malas hierbas que controlan, momento de aplicación, fitotoxicidades,... Los productos con (*) pueden utilizarse desde el primer año de plantación, pero debe consultarse con la casa comercial.

Estos productos herbicidas, como cualquier otro producto fitosanitario, aplicado adecuadamente no debe producir ningún trastorno sobre el viñedo. No obstante, estos últimos años durante la primavera y verano venimos observando anomalías en bastantes viñedos, consistentes en:

- **hojas de color amarillo pálido distribuido por todo el limbo, incluso sin respetar los nervios, al final las hojas se van desecando y pueden llegar a caer.** Estos síntomas fitotóxicos han sido debidos al **herbicida residual** utilizado en cada caso. Pueden confundirse estos síntomas con los de la clorosis férrica o la virosis del entrenudo corto.
- **brotaciones raquílicas, hojas deformadas y endurecidas,** debidos a la absorción de **glifosato**, bien por los cortes de poda o por la madera de menos de 4 años.
- **hojas con zonas de color blanquecino iniciándose por los bordes,** debidas a la absorción de **amitrol**, bien por los cortes de poda o por la madera de menos de 4 años.

Como consecuencia de esto volvemos a insistir sobre la necesidad de:

- no sobrepasar la **dosis de producto/ha** recomendada.
- si se van a utilizar **glifosato** o **amitrol** para controlar las malas hierbas existentes, no se debe realizar el tratamiento mojando los pulgares, ya que la madera de éstos sólo tiene 1 año y puede absorber el producto.

CARENCIA DE POTASIO

Desde mediados del mes de Julio hasta la vendimia, es frecuente observar en muchos viñedos la siguiente sintomatología: **las hojas más jóvenes comienzan a amarillear (variedades blancas) o enrojecer (variedades tintas) por el borde, penetrando posteriormente por las zonas internerviales, seguido de necrosis y defoliación, previo encorvamiento de la hoja hacia la parte superior formando como una cuchara. A veces, las hojas adquieren un color bronceado típico, ocasionando una maduración irregular de los racimos y una disminución considerable del grado.**

Estos síntomas se han observado preferentemente en plantaciones jóvenes con mucha producción, siendo la variedad que más lo ha manifestado Tempranillo.

Para corregir esta carencia adecuadamente es necesario aportar al suelo la cantidad de potasio que nos indique un análisis de tierra. No obstante, como cifra orientativa se puede dar la cantidad de 500 Kgr. de potasa/Ha como abonado de invierno, y al observar los primeros síntomas (un poco antes del envero) realizar 3 ó 4 tratamientos en pulverización con nitrato potásico a la dosis de 1 Kgr/100 l. de agua, a intervalos de unos 10 días.



Amarilleamiento en borde de hojas jóvenes por carencia de potasio en variedad blanca.



Encorvamiento y enrojecimiento en borde de hojas jóvenes por carencia de potasio en variedad tinta.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El MAGRAMA nos ha comunicado en fecha 10 de diciembre la **autorización excepcional del 1,3-dicloropropeno en plantación de viñedo durante el periodo del 3 de diciembre de 2012 al 10 de marzo de 2013**