



Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2019

29 de Abril de 2021

Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2019 se produjeron 34.455 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 50,5% correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 42,6%. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,9%, 43,4% excluyendo las diagnósticos asociados a la maternidad.

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	34.455	100,0	17.047	17.408	4.873.767	100,0	2.344.850	2.528.917
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	4.822	14,0	2.653	2.169	600.086	12,3	329.960	270.126
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.797	13,9	2.630	2.167	614.302	12,6	349.256	265.046
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.602	13,4	2.578	2.024	606.019	12,4	336.719	269.300
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.203	9,3	1.556	1.647	454.661	9,3	232.190	222.471
0200 - Neoplasias (Tumores)	3.024	8,8	1.637	1.387	466.543	9,6	247.531	219.012
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.730	7,9		2.730	413.837	8,5		413.837
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.526	7,3	1.264	1.262	350.315	7,2	170.940	179.375
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	2.242	6,5	1.141	1.101	359.877	7,4	168.501	191.377
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	1.464	4,2	822	642	195.211	4,0	104.486	90.725
Resto de causas	5.045	14,6	2.766	2.279	812.916	16,7	405.267	407.648

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato respiratorio" con 4.822, lo que equivale al 14% del total. En España alcanzan el 12,3% de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.797 altas (13,9% del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,6% del total. "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.602 altas (13,4% del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 12,4%.

Estancias hospitalarias

En 2019 se contabilizaron en La Rioja un total de 312.437 estancias hospitalarias, de las que el 50,7% fueron de varones. En España el 52,1% de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 53,5% en La Rioja y al 55,3% en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	312.437	100,0	158.414	154.023	39.584.782	100,0	20.620.604	18.964.178
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	63.784	20,4	31.248	32.536	5.965.518	15,1	3.437.526	2.527.992
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	43.618	14,0	23.501	20.117	5.572.561	14,1	3.082.338	2.490.223
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	34.053	10,9	18.756	15.297	4.358.304	11,0	2.399.714	1.958.590
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	31.819	10,2	13.197	18.622	3.878.480	9,8	1.866.572	2.011.908
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	27.316	8,7	14.984	12.332	3.393.696	8,6	1.859.039	1.534.658
0200 - Neoplasias (Tumores)	26.768	8,6	15.529	11.239	3.811.756	9,6	2.194.291	1.617.465
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	15.238	4,9	7.652	7.586	1.795.764	4,5	905.025	890.739
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	10.691	3,4	5.171	5.520	1.847.084	4,7	814.753	1.032.331
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	10.686	3,4	6.095	4.591	1.202.668	3,0	682.621	520.048
Resto de causas	48.464	15,5	22.281	26.183	7.758.951	19,6	3.378.725	4.380.224

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por diagnóstico principal, "Trastornos mentales y de comportamiento" son las que más estancias provocaron, con un 20,4% del total. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con el 14% y en tercer lugar "Enfermedades del aparato respiratorio" con el 10,9% del total de estancias.

Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2019 fue de 9,1 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,1 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,3 días para los hombres (8,8 días en España) y los 8,8 días en mujeres (7,5 en España).


Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	9,1	9,3	8,8	8,1	8,8	7,5
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	99,3	81,0	127,1	50,6	56,3	44,5
ALTA - Altas sin diagnóstico	17,6	27,7	2,9	24,6	21,9	27,3
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	13,0	12,3	14,1	7,1	8,5	6,1
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	11,3	11,9	10,6	8,8	8,7	8,9
1200 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	11,2	13,1	9,2	8,7	8,4	9,1
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	10,5	10,2	10,8	10,2	10,5	9,9
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	9,9	8,5	11,3	8,5	8,0	9,0
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9,6	11,8	7,5	7,0	8,7	5,9
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,1	8,9	9,3	9,1	8,8	9,4
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	8,9	8,8	8,9	11,2	11,0	11,4

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Trastornos mentales y de comportamiento" (99,3 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 50,6 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: de 1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 45 a 54 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 65 a 74 años y de 90 a 94 años .

Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 65 a 74 años, con 17,1 días para las mujeres y 9,6 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 85 a 89 años, con 11,3 días para las féminas y 14,9 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 6,3 días para las niñas y a 7 días para los niños.

Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2019, el 88,3% de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 11,7% restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 79,1% y al 20,9% respectivamente.

	Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital							
	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	30.421	88,3	4.034	11,7	247.087	79,1	65.350	20,9
Hombres	14.801	86,8	2.246	13,2	127.031	80,2	31.383	19,8
Mujeres	15.620	89,7	1.788	10,3	120.056	77,9	33.967	22,1
ESPAÑA	3.547.908	72,8	1.325.859	27,2	27.239.862	68,8	12.344.920	31,2
Hombres	1.723.653	73,5	621.197	26,5	14.552.540	70,6	6.068.063	29,4
Mujeres	1.824.255	72,1	704.662	27,9	12.687.321	66,9	6.276.857	33,1

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,7% de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 86,8%. A nivel nacional los porcentajes fueron del 72,1% para las mujeres y del 73,5% para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 79,1% se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 68,8% en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 77,9% para las mujeres y al 80,2% para los varones.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2019 se produjeron en La Rioja 10.958 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 10.347.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	10.958	10.347
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.534	1.274
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.526	1.304
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.464	1.287
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	1.019	965
0200 - Neoplasias (Tumores)	962	990
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	868	879
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	803	744
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	713	764
1800 - Síntomas, signos y hallazgos anormales	466	414

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por grupos de enfermedades, en 2019 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato respiratorio", con un valor alcanzado de 1.534 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.274

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato circulatorio" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.526 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.304.

Comunidades Autónomas

En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Cataluña (11.853 altas por cada 100.000 habitantes), Asturias (11.413) y País Vasco (11.343).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Canarias (8.391), Andalucía (8.400) y Castilla - La Mancha (8.554).

Altas por 100.000 hab. y estancia media		
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.347	8,1
Andalucía	8.400	7,0
Aragón	11.330	8,5
Asturias	11.413	8,0
Baleares	11.195	8,2
Canarias	8.391	11,4
Cantabria	9.953	9,5
Castilla y León	10.907	10,4
Castilla-La Mancha	8.554	7,1
Cataluña	11.853	9,4
C. Valenciana	10.433	6,3
Extremadura	10.306	7,8
Galicia	11.150	7,8
Madrid	10.937	7,4
Murcia	10.335	8,3
Navarra	10.417	8,0
País Vasco	11.343	8,5
LA RIOJA	10.958	9,1

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes






En relación a la estancia media, Canarias (11,45 días), junto con Castilla y León (10,39 días) y Cantabria (9,46 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6,3 días), Andalucía (7 días) y Castilla - La Mancha (7,1 días).

Estancia media en días





Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevado a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta nueva clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:



 @riojastat