

Avetoro común

Botaurus stellaris L.


Familia Ardeidae.

* **Datos generales:** Garza de tamaño medio con cuerpo robusto y cuello grueso, de color canela con veteados, bigotera y píleo oscuros. La base de su alimentación comprende invertebrados acuáticos, anfibios y micromamíferos. La época reproductora comienza en febrero con el celo y hacen los nidos en plataformas de carrizo. Los pollos son cuidados por la hembra hasta que desarrollan su plumaje y abandonan el nido.



* **Hábitat:** Asociado a carrizales extensos en humedales de agua dulce o salobre, sobre todo en la época reproductora. El resto del año se puede encontrar en ríos, embalses o cultivos cercanos.

* **Distribución:** La zona de cría comprende áreas templadas de todo el continente euroasiático. En la Península Ibérica, las poblaciones son residentes, pero se encuentran muy fragmentadas con dos núcleos importantes en el valle del Ebro y Doñana. Las citas en la Rioja se concentran en un tramo del río Ebro y en alguna zona húmeda de Calahorra y Alfaro.



* **Amenazas:**

- Destrucción y desaparición de hábitat favorable.
- Contaminación y eutrofización de humedales.
- Caza furtiva y colisión con tendidos eléctricos.

* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Catálogo Español de Especies Amenazadas	Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE)	Red Natura 2000:
En peligro de extinción	En peligro de extinción	Anexo I	Parte del hábitat.

También, otra parte del hábitat y la distribución se incluye en varias Áreas Naturales Singulares.

* **Bibliografía:**

- Vera, P. 2022. Avetoro común *Botaurus stellaris* En, B. Molina, A. Nebreda, A. R. Muñoz, J. Seoane, R. Real, J. Bustamante y J. C. del Moral: III Atlas de las aves en época de reproducción en España. SEO/BirdLife. Madrid. <https://atlasaves.seo.org/ave/avetoro-comun/>
- MPF, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons