

Murciélago ratonero mediano

Myotis blythii Tomes.

Familia *Vespertilionidae*.

* **Datos generales:** Destaca por la presencia de una mancha blanca en el pelaje frontal. Más esbelto y con hocico más fino que otras especies del género *Myotis*. Se alimentan de insectos, principalmente de ortópteros y coleópteros que atrapan al vuelo o sobre hojas de árboles. Forma grandes colonias reproductoras, que se disgregan a finales de verano. No se conoce muy bien su fenología, pero no debe diferir mucho de la de *M. myotis*.

* **Hábitat:** Es típica de espacio abiertos como praderas y pastizales con arbolado disperso. Usan cavidades subterráneas como refugio y sólo se alejan decenas de kilómetros de éstos.

* **Distribución:** Sur de Europa, por oriente próximo hasta la India con poblaciones aisladas en China. En la Península se estiman unos 20.000 ejemplares distribuidos por todo el territorio de manera desigual. Presente en La Rioja en cuevas del Camero Nuevo y Urbión.

* **Amenazas:**

- Molestias en los refugios durante la época reproductora.
- Pérdida de refugios.
- Poblaciones fragmentadas y con bajo número de individuos.

* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Catálogo Español de Especies Amenazadas	Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE)	Red Natura 2000
Vulnerable	Vulnerable	Anexos II y IV	Toda la distribución.

El Gobierno de La Rioja subvenciona a los particulares que tengan colonias de esta especie en sus propiedades según la [Orden 15/2006, de 12 de septiembre](#).

* **Bibliografía:**

- Noger, J. y Garrido, J. A. 2007. *Myotis blythii* (Tomes, 1857). Ficha Libro Rojo. Pp: 158-162. En: L. J. Palomo, J. Gisbert y J. C. Blanco (eds). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid.
- Imagen: By Amirekul - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81949885>

