

Murciélago ratonero bigotudo

Myotis mystacinus Kuhl.

Familia *Vespertilionidae*.



© Gilles San Martin


* **Datos generales:** Especie gemela de *M. alcaethoe*. Tiene el rostro, las orejas y las membranas alares de color pardo negruzcas. El dorso lo tienen de color castaño dorado y el vientre de un crema pálido. Las membranas alares se insertan la base del dedo más externo del pie y tiene la misma muesca en las orejas que *M. alcaethoe*. Se alimenta de artrópodos que caza al vuelo durante el atardecer y la noche. Se reproducen a mediados de junio formando colonias de cría.

* **Hábitat:** Especie forestal de zonas montañosas que prefiere bosques maduros de frondosas. En verano se refugia en grandes grietas de árboles, mientras que en invierno usa túneles, cuevas y construcciones con temperaturas bajas y alta humedad.

* **Distribución:** Paleártica, localizada por el sur y centro de Europa, norte de África hasta Japón. En la Península Ibérica, aparece en la mitad septentrional. En nuestra región se encuentra muy localizada en el Alto Iregua.

* **Amenazas:**

- Pérdida de hábitat y refugios.
- Molestias durante la reproducción por actividades silvícolas.
- Poblaciones fragmentadas y con bajo número de individuos.
- Incendios forestales.



* **Conservación:** Taxón incluido en:

Catálogo Riojano de Especies Amenazadas	Catálogo Español de Especies Amenazadas	Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE)	Red Natura 2000
Vulnerable	Vulnerable	Anexos II y IV	Toda la distribución.

* **Bibliografía:**

- Aguirre-Mendi, P.2007. *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1817). Ficha Libro Rojo. Pp: 176-181. En: L. J. Palomo, J. Gisbert y J. C. Blanco (eds). Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad -SECEM-SECEMU, Madrid.
- Imagen: By Gilles San Martin from Namur, Belgium - *Myotis mystacinus* sUploaded by Jacopo Werther, CC BY-SA 2.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24611308>