



Informe Anual de la Calidad del Aire en La Rioja.

PERIODO 2002-2018

Servicio de Gestión y Control de Residuos.

Estado de la Calidad del Aire

NORMATIVA

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono (derogado por el Real Decreto 102/2011).
- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. (derogado por el Real Decreto 102/2011).
- Real Decreto 812/2007, de 22 de junio sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclico. (derogado por el Real Decreto 102/2011).
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
- Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
- Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA RIOJA

La Red de medición de la calidad del aire en La Rioja está constituida por la estación de medida de Logroño (La Cigüeña), que representa el estado de la calidad del aire en la zona urbana. A la Red se añade desde el año 2003 la estación de Alfaro, que surge con motivo de la necesidad de vigilancia de la posible influencia en la calidad del aire de La Rioja Baja de las centrales de ciclo combinado situadas en Castejón. Bajo la misma motivación y desde enero del año 2005, se incorporan a la Red las tres estaciones para la

Gobierno de La Rioja

vigilancia de la central de ciclo combinado de Arrúbal. Las estaciones se denominan “Arrúbal”, “Galilea” y “Pradejón”, de acuerdo con los municipios donde se ubican.



Ilustración 1.- Estaciones de calidad del aire.

Los niveles de concentración de contaminantes son analizados cada 15 minutos en cada una de las estaciones, a excepción de las partículas que son medidos cada hora en las estaciones de La Cigüeña y Alfaro y en las otras tres estaciones a partir de final del año 2016. Los datos de concentración son enviados de forma automática cada día al centro de control de datos situado en la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, donde serán validados o anulados en el supuesto de que se detecte alguna anomalía o fallo técnico en la medición.

Los datos una vez validados son dispuestos al día siguiente en la página de Internet de información de calidad ambiental de La Rioja: www.larioja.org/atmosfera, donde cualquier ciudadano puede consultarlos de forma gratuita y desde cualquier lugar.




Ilustración 2.- Esquema de la Red de Medición de la calidad del aire de La Rioja

El centro de control de las estaciones, cuenta con un sistema informático que almacena indefinidamente los datos generados por los analizadores de las estaciones, así como las incidencias registradas en el funcionamiento. La información se remite de forma periódica desde las estaciones de medición al centro de control y procesamiento de los datos, localizado en la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua. En éste se efectúa su gestión, que comprende comprobar la recepción de los datos y validarlos.

Gobierno de La Rioja

El control de la calidad de los datos es básico para el buen funcionamiento del sistema y se lleva a cabo a través de los siguientes procesos:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red, que además conlleva:
- La reparación inmediata de las anomalías.
- La revisión y calibración periódicas de los equipos.

Validación de la información recibida, anulando o corrigiendo aquellos datos que sean erróneos. Para ello, se tomarán en cuenta:

- Las perturbaciones debidas al mantenimiento, calibrado o problemas técnicos.
- Las mediciones realizadas fuera de escala.
- Las variaciones excesivas o producidas de forma muy rápida.
- Las influencias climáticas o meteorológicas.

Por otra parte, el almacenamiento de datos permite también la detección de mediciones erróneas a través de técnicas como las comparativas o el análisis de la desviación estándar.

Delimitación de zonas y aglomeraciones.

En la evaluación de la calidad del aire ambiente de La Rioja participan dos zonas: la urbana (ES1704) y la rural (ES1705). A efectos prácticos y para simplificar se denominarán a partir de ahora zona urbana y zona rural.

- Zona Urbana (ES 1704): Esta zona está representada por la estación de La Cigüeña (ES1602A), ubicada en el término municipal de Logroño y es representativa de las zonas urbanas contiguas de los municipios de Logroño y Lardero (99.93 Km²)¹. La estación de La Cigüeña es una estación urbana de fondo.
- Zona Rural (ES1705): Esta zona está representada por las estaciones de Alfaro, Arrúbal, Galilea y Pradejón (ES1649A, ES1779A, ES1746A y ES1753A, respectivamente).

ZONA	ESTACIÓN	CÓDIGO EOI	CÓDIGO LOCAL
Urbana ES1704	LA CIGÜEÑA	ES1602A	26089001
Rural ES1705	ALFARO	ES1649A	26011001
	ARRÚBAL	ES1779A	26019001
	GALILEA	ES1746A	26066001
	PRADEJÓN	ES1753A	26117001

Tabla 1.- Estaciones de La Rioja

¹ La superficie de la aglomeración de Logroño (Logroño y Lardero) es un dato extraído de la zonificación de La Rioja.

Gobierno de La Rioja




Ilustración 3.- Mapa de La Rioja con la zonificación para la evaluación de la calidad del aire.

Los objetivos de calidad del aire de la Rioja para la zona Urbana (ES1704) son objetivos de protección de la salud humana por lo que se evaluará la calidad del aire conforme a estos objetivos. Para la zona Rural (ES1705) los de objetivos de calidad del aire son de protección de la salud, de la vegetación y de los ecosistemas.

Estaciones, métodos de medición utilizados y contaminantes.

La estación de medición de calidad del aire de la aglomeración de Logroño, que está situada en la calle La Cigüeña, por su ubicación y la población a la que representa, pertenece al tipo de estaciones urbanas de fondo como ya se ha indicado. En esta estación se miden los siguientes contaminantes: SO₂, NO, NO₂, CO, O₃, PM₁₀, Benceno, Tolueno y Xileno, y desde el año 2009 se ha medido también PM_{2,5} mediante el método de referencia gravimétrico para el cálculo del Indicador Medio de Exposición 2.5 (IME 2.5). El resto de las estaciones representan áreas suburbanas o rurales y en ellas se miden los siguientes contaminantes: SO₂, NO, NO₂, CO, O₃, PM₁₀ y PM_{2,5}. El plomo y los metales pesados se evalúan a partir de los datos de la red de biomonitorización de metales pesados y mediante modelizaciones del Ministerio.

Las técnicas analíticas para la medición de las partículas (PM₁₀ en todas las estaciones y PM_{2,5} en todas las estaciones menos en la Cigüeña) son absorción beta, y los factores de corrección utilizados para el PM₁₀ han sido determinados a partir de los ejercicios de intercomparación del Convenio Ministerio de Medio Ambiente-ISCIII. Los datos de partículas con los que se trabaja deben tener aplicados los factores de corrección correspondientes.

Los datos validados de la red son enviados al Ministerio de Medio Ambiente, para la inclusión en las redes de vigilancia de la calidad del aire.

ZONA	ESTACIONES	CONTAMINANTES ANALIZADOS
Urbana	“La Cigüeña”	SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , O ₃ , BTX ² (PM _{2,5} gravimétrico desde 2009)
Rural	“Alfaro”	SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , O ₃ , PM _{2,5}
	“Arrúbal”	SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , O ₃ , PM _{2,5}
	“Galilea”	SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , O ₃ , PM _{2,5}
	“Pradejón”	SO ₂ , NO _x , CO, PM ₁₀ , O ₃ , PM _{2,5}

Tabla 2.- Estaciones de medición de la calidad del aire y contaminantes que se analizan en cada una de las zonas.

² Benceno, Tolueno y Xileno

Gobierno de La Rioja

RED AUTONÓMICA DE BIOMONITORIZACIÓN DE METALES PESADOS EN LA RIOJA (RABMPLR)

Desde la firma de los protocolos referentes a la contaminación atmosférica EMEP (Ginebra, 1984) y Heavy Metals (Aarhus, 1998) La Rioja adquirió, junto con el resto del España, una serie de compromisos de evaluación de la concentración de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos. En este marco normativo se inscriben las Directivas Europeas 2008/50/CE y 2004/107/CE incorporadas en el derecho español mediante el Real Decreto 102/2011 que sintetizó otros anteriores y que hace referencia entre otros, a la evaluación del Plomo, Arsénico, Cadmio, Mercurio y Níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Los metales pesados presentes en la atmósfera son nocivos por bioacumulación, vía inhalación, siendo los más representativos el plomo (Pb), cadmio (Cd) y mercurio (Hg), cuyo origen se relaciona fundamentalmente con la combustión de carburantes fósiles, los centros metalúrgicos, la minería y la incineración de residuos. La Directiva 2004/107/CE sobre la calidad del aire contempla además como elementos de control prioritarios el arsénico (As) y el níquel (Ni).

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones normativas y velar por una calidad del aire ambiente óptima para la salud humana y el medio ambiente, y de acuerdo con las competencias adquiridas por la Comunidad de La Rioja en materia de Medio Ambiente, desde el año 2006 se mantiene una red de biomonitorización de metales pesados con 25 puntos de muestreo de musgo para determinar la concentración y evaluar el impacto del arsénico, cadmio, níquel, plomo y mercurio. Los puntos de muestreo se distribuyen por todo la territorio de La Rioja e incluso abarcan superficie fuera de la comunidad para dar robustez al muestreo y, en su caso, poder establecer conexiones con el posible origen de la contaminación. Un equipo de la Universidad de La Rioja se ha encargado del diseño de la red, muestreo y preparación de muestras e interpretación de los datos obtenidos y un equipo de la Universidad de Santiago de las determinaciones analíticas.

Los trabajos de investigación realizados se apoyan en el análisis del musgo *Hypnum cupressiforme*. Estos musgos acumulan metales pesados en sus células en concentraciones superiores a las de los medios donde viven; debido a esta capacidad, la concentración de metales pesados es más fácil de detectar a través de los musgos que midiendo directamente el aire o el agua. Los musgos constituyen así un bioindicador de los niveles de metales pesados que podrán acumularse en nuestro organismo y en los ecosistemas a partir de la contaminación del aire.

La Red de Biomonitorización de La Rioja ha sido, tras la de Galicia, la segunda red española en incorporarse en la Red ICP-Vegetation (*The International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops*). Se trata de un programa que provee datos sobre la concentración de metales pesados en musgos nativos como una medida del impacto de estos contaminantes sobre los ecosistemas y la salud humana; y que proporciona acceso a información más global que permita mejores resultados interpretativos de los datos analíticos.

Hasta la fecha se han completado seis campañas de muestreo, análisis e interpretación de los resultados. En la campaña 2016-2017, en base a las recomendaciones del informe final de la campaña 2014-2015, se llevó a cabo una nueva campaña de muestreo de los programas europeos *Heavy Metals in Mosses Survey* e *ICP-Vegetation* incluyendo entre los contaminantes el nitrógeno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).


En la campaña en curso, 2018-2019, además del muestreo de musgo natural en los 25 puntos de la red básica, se han realizado dos actuaciones novedosas.

- En el área metropolitana de Logroño. gracias a un convenio con la Fundación La Caixa, se han realizado durante el año 2018 trabajos más específicos de biomonitorización del contenido de metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y nitrógeno, empleando biomonitores de musgo transplantado Mossphere® y ejemplares ornamentales de Aligustre (*Ligustrum*). Los

Gobierno de La Rioja

dispositivos Mossphere® se ubicaron en 84 puntos en una malla regular de 575 metros de lado y las muestras en aligustre se recolectaron en 50 árboles del casco urbano de Logroño, en una malla irregular de aproximadamente 500 metros de lado.

- Además, se han emplazado biomonitores Mossphere® en las cinco estaciones automáticas de la red de calidad del aire, correlacionables con otros tantos puntos de la red básica de biomonitorización. En los dispositivos Mossphere® o muestras de estos diez puntos, además de los metales se analizará el nitrógeno total y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), al objeto de avanzar en la determinación de la relación entre ambas metodologías.



Mapa 1. 1. Localización de las 25 estaciones de muestreo del musgo *Hypnum cupresiforme* empleadas en la campaña 2018-2019.

Gobierno de La Rioja

ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

1. Contaminación atmosférica relacionada con la salud.

En 2018, en la red de vigilancia de la calidad del aire de La Rioja se han alcanzado ratios muy aceptables de datos válidos. Según la Directiva 2008/50/CE, en mediciones fijas se exige, para el cumplimiento de los objetivos de calidad de los datos para la evaluación de la calidad del aire ambiente, una recogida de datos mínima como la que se indica:

Contaminante	Incertidumbre	Recogida mínima de datos
NO _x	15%	90%
PM ₁₀	25%	90%
SO ₂	15%	90%
O ₃	15%	90% (75% en invierno)
CO	15%	90%
Benceno	25%	90%

Tabla 3.- Niveles mínimos de calidad de los datos.

En La Rioja se han alcanzado los siguientes ratios de recogida de datos válidos:

Datos horarios	Calidad de datos (% datos válidos)				
	La Cigüeña	Alfaro	Arrúbal	Galilea	Pradejón
NO _x	99%	99%	98%	99%	98%
PM ₁₀	96%	98%	99%	98%	98%
SO ₂	99%	99%	99%	99%	98%
O ₃	98%	99%	99%	98%	98%
CO	97%	99%	99%	99%	98%
Benceno	98%				

Tabla 4.- % de datos válidos horarios en la Red de La Rioja.

Datos diarios	Calidad de datos (% datos válidos)				
	La Cigüeña	Alfaro	Arrúbal	Galilea	Pradejón
NO _x	99%	99%	98%	99%	98%
PM ₁₀	95%	98%	99%	98%	98%
SO ₂	99%	99%	100%	99%	98%
O ₃	98%	99%	99%	98%	98%
CO	96%	100%	100%	99%	99%
Benceno	98%				

Tabla 5.- % de datos válidos diarios en la Red de La Rioja.

Como se puede observar se han alcanzado y superado los umbrales mínimos de recogida de datos válidos, por lo que la evaluación de la calidad del aire se puede llevar a cabo con un número suficiente de datos.

Gobierno de La Rioja

Una vez considerada que la representatividad de la información es la suficiente, se puede estudiar la situación general de la calidad del aire en La Rioja:












ZONA URBANA	ZONA RURAL
OZONO	
 El ozono, en la aglomeración urbana, se mantiene por debajo del valor límite.	 Para la zona rural, suben los niveles de ozono, aunque siguen permaneciendo por debajo del valor límite.
MONÓXIDO DE CARBONO	
 Al igual que en años anteriores, los niveles de CO se mantienen muy bajos para el año 2018.	 La situación se repite tanto en las zonas rurales como en la zona urbana. Los valores se mantienen siempre muy lejanos al valor límite.
PARTÍCULAS PM10	
 Para la aglomeración urbana, en 2018 se mantiene el nivel de los valores registrados en los últimos años.	 En la zona rural se observan valores de partículas de orden de magnitud similar a años anteriores y por debajo del umbral.
ÓXIDOS DE NITRÓGENO	
 En la zona urbana, los niveles de óxidos de nitrógeno muestran una tendencia variable pero por debajo del valor límite de calidad del aire.	 Los valores de NO ₂ se mantienen constantes en las zonas rurales y siempre muy por debajo del valor límite horario de protección de la salud.
DIÓXIDO DE AZUFRE	
 Los niveles de SO ₂ continúan manteniéndose muy bajos en la zona urbana y en la zona rural.	 Los niveles de SO ₂ continúan manteniéndose muy bajos tanto en la zona urbana como en la zona rural.
BENCENO Y TOLUENO	
 Respecto a los compuestos orgánicos volátiles, se observan valores muy bajos de estos contaminantes y muy lejanos a los valores límites indicados en la normativa.	

Tabla 6.- Contaminantes y su tendencia en el último año.

A continuación se presenta la información resumida en los cuadros anteriores de manera gráfica. Los datos de la zona urbana se corresponden a los **valores medios** de la estación de La Cigüeña, mientras que los datos de la zona rural son los **valores máximos de los valores medios** de cada una de las estaciones que se consideran rurales (Alfaro, Arrúbal, Galilea y Pradejón).




Gráfico 1.- Distancia a los valores límite de los niveles de protección de salud en zonas urbanas.




Gráfico 2.- Distancia a los valores límite de los niveles de protección de salud en zonas rurales.




Gráfico 3.- Distancia a los valores límite de los niveles de protección de ecosistemas en zonas rurales.

Gobierno de La Rioja

En esta última gráfica se representan los valores registrados de NO_x, SO₂ y ozono (AOT vegetación) en las zonas rurales, que son las de mayor interés para la protección de la vegetación y de los ecosistemas, y su distancia a los valores límite de calidad del aire establecidos por la normativa. Como se puede observar en los tres casos los valores registrados están por debajo del valor límite de protección de los ecosistemas.

Los datos de calidad del aire son remitidos al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la base de datos sobre calidad del aire de la Comisión Europea.

2. Datos de calidad del aire 2002-2018.

2.1. Sinopsis de las pautas y tendencias.

En el **grafico 4** y en los siguientes se ilustra la evolución de las concentraciones, tomando como referencia los valores medios de la estación de La Cigüeña para la zona urbana y los valores medios de las estaciones de Arrúbal, Galilea, Pradejón y Alfaro para la zona rural. En cada año, el valor obtenido representa la media de todas las estaciones de la zona correspondiente, pero también se indicará, en los casos que sean de interés, los valores máximos de la zona correspondiente, es decir el valor de un contaminante registrado en una de las estaciones que sirven para evaluar la calidad del aire de la zona a la que pertenece, y que a efectos prácticos es el valor que se a va a tener en cuenta en la evaluación para la Comisión Europea.

Las concentraciones se refieren a los valores límite que figuran en el Real Decreto 102/2011, que indican la concentración en el día u hora de mayor concentración por encima de x+1, donde x es el valor límite que no debe superarse.

Contaminante	Valor límite u objetivo elevados a corto plazo (1-24 horas).
SO ₂	125 µg/m ³ , valor diario que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año civil.
NO ₂	200 µg/m ³ , valor horario que no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año civil.
PM ₁₀	50 µg/m ³ , valor diario que no podrá superarse en más de 35 ocasiones por año.
Ozono	120 µg/m ³ , valor objetivo máximo de las medias octohorarias del día, que no deberá superarse más de 25 ocasiones por cada año civil de promedio en un período de 3 años.

Tabla 7.- Valores límite horarios establecidos en el RD 102/2011, para cada uno de los contaminantes.

Gobierno de La Rioja




Gráfico 4.- Gráficas de tendencias de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en zonas urbanas y rurales.

Nota: SO₂-max4: 4ª concentración media diaria más alta de SO₂
 PM₁₀-max36: 36ª concentración media diaria más alta de PM₁₀
 NO₂-max19: 19ª concentración media horaria más alta de NO₂
 O₃-max26: 26ª concentración diaria en 8 horas más alta de O₃.

Las emisiones de SO₂ muestran unas concentraciones estables en la aglomeración urbana y en zonas rurales, tanto en valores medios anuales como en máximos.

Con respecto a las partículas, tanto en la zona urbana como en la rural los valores medios anuales son más o menos estables, y se materializa en datos, que cumplen la normativa, referida a las superaciones del valor límite diario.

El valor medio de NO_x en la aglomeración urbana se ha incrementado algo los valores de los últimos años. En todo caso los valores se mantienen muy por debajo del límite máximo horario de 200 µg/m³. En las zonas rurales, que se encuentran más alejadas del tráfico, los valores registrados presentan tendencias más suaves y estables.

En cuanto al ozono, las subidas y bajadas de sus valores medios y máximos obedecen sobre todo al número de días soleados en periodo de primavera y verano y a la temperatura principalmente, así como a la emisión de los precursores en la zona. En el 2018 se ha observado un ligero incremento de los valores medios anuales. No obstante, ambas zonas, continúan sin superar los valores límite de protección de la salud.

Gobierno de La Rioja

2.2. Óxidos de azufre.

El SO₂ es un gas incoloro no inflamable. Presenta un olor fuerte e irritante para altas concentraciones (más de 8,5 mg/Nm³).

Su vida media en la atmósfera se estima en días, de modo que puede ser transportado hasta grandes distancias; es considerado uno de los principales responsables del fenómeno de la lluvia ácida.

Durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos, es decir, sales que pueden ser transportadas en el material particulado respirable (PM₁₀) y que en presencia de humedad forman ácidos. Luego, estos ácidos son una parte importante del material particulado secundario o fino (PM_{2,5}), de ahí la importancia del estudio, entre otros motivos, del PM_{2,5} y del indicador medio de exposición (IME).

Tanto la exposición a sulfatos como a los ácidos derivados del SO₂, es de extremo riesgo para la salud debido a que éstos ingresan directamente al sistema circulatorio humano a través de las vías respiratorias.

El SO₂ se origina en la combustión de carburantes con un cierto contenido en azufre (carbón, fuel, gasóleos...) en instalaciones de combustión de carbón y fuel, procesos industriales, tráfico de vehículos pesados, calefacciones de carbón y fuel, etc. También existen fuentes naturales de éste contaminante como las erupciones volcánicas.

Concentraciones altas de éste contaminante afectan al aparato respiratorio, agravan enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes y provocan irritación en los ojos. El dióxido de azufre se ha asociado a problemas de asma y bronquitis crónica, aumentando la morbilidad y mortalidad en personas mayores y niños.

Otros efectos preocupantes son la deposición húmeda o seca de los compuestos ácidos que origina sobre la cubierta vegetal y suelo así como sobre materiales de construcción (mármol, caliza...).

Los datos anuales que se representan en la **gráfica 5** toman como referencia el valor límite para la protección de los ecosistemas. No obstante este límite sólo es aplicable a determinadas zonas regionales donde hay un ecosistema a proteger (en el caso de La Rioja sólo se evalúa la calidad del aire respecto a los valores límite de protección de los ecosistemas en la zona rural, es decir mediante los datos de las estaciones de Arrúbal, Galilea, Pradejón y Alfaro). Debido al origen del SO₂ (tráfico, combustión, procesos industriales...) siempre se observan niveles más altos del contaminante en la aglomeración urbana de Logroño que en zonas rurales.

Para el cálculo de los valores de protección de ecosistemas se han tomado los datos de las estaciones rurales durante el periodo invernal (01 de octubre al 31 de marzo).




Gráfico 5.- Media anual SO₂- Protección de los Ecosistemas.

Gobierno de La Rioja

Con respecto a la protección de la salud, en el periodo de estudio se constata que además de estar muy lejos del valor límite diario ($125 \mu\text{g}/\text{m}^3$), no se ha superado el umbral de alerta de $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$.




Gráfico 6.- 4º valor más alto SO₂ en todas las estaciones.

2.3. Óxidos de nitrógeno.

Los óxidos de nitrógeno de mayor interés como contaminantes en calidad del aire son el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO₂). El NO₂ es un gas pardo-rojizo, no inflamable, de olor asfijante y tóxico. Sus fuentes de emisión principales son los procesos de combustión a altas temperaturas, en los cuales se combinan el oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire y dan lugar a NO que, posteriormente, por la acción de oxidantes atmosféricos como el ozono, se convierte en NO₂. En las ciudades, el tráfico constituye la principal fuente de emisiones.

Los óxidos de nitrógeno (NO_x) junto con los compuestos orgánicos volátiles (COV), son los principales precursores del ozono troposférico, uno de los mayores problemas de calidad del aire en muchas ciudades españolas.

Entre los posibles daños a la salud están los que afectan al aparato respiratorio provocando bronquitis, neumonía y menor resistencia a las infecciones de las vías respiratorias. Bajos niveles de óxidos de nitrógeno en el aire pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, y causar tos y una sensación de falta de aliento, cansancio y náusea. La exposición a bajos niveles también puede producir acumulación de líquido en los pulmones 1 ó 2 días después de la exposición. Respirar altos niveles de óxidos de nitrógeno puede rápidamente producir quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la garganta y las vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo acumulación de líquido en los pulmones y la muerte.

De igual forma, los NO_x tienen (sobre todo el NO₂) efectos sobre la vegetación, presentando sinergias con el SO₂. Los óxidos de nitrógeno se transforman en la atmósfera en ácido nítrico (HNO₃), constituyente de la lluvia ácida; igualmente son considerados importantes precursores de la contaminación por ozono troposférico, como consecuencia de las reacciones fotoquímicas con los hidrocarburos.

En cualquier caso, los niveles registrados en las estaciones de La Rioja muestran unos niveles bajos, generalmente inferiores en zonas rurales que en la aglomeración urbana, pero ambas zonas por debajo del valor límite para la salud humana.

Gobierno de La Rioja




Gráfico 7.- Media anual NO₂.- Protección de los ecosistemas.




Gráfico 8.- 19º valor más alto NO₂ en todas las estaciones.

En la estación urbana de Logroño, el valor se ha reducido, después de los repuntes de los años 2014 y 2017, y la previa bajada de los niveles medios y máximos de óxidos de nitrógeno de los años anteriores. A lo largo de todos los años de los que se dispone de información de calidad del aire de esta estación urbana (2002-2018) se han observado aumentos y disminuciones de los valores de inmisión de este contaminante. En el 2018 el valor de NO₂ está por debajo del valor límite de calidad del aire (200 µg/m³).

En las zonas rurales, los niveles de óxidos de nitrógeno se mantienen muy bajos y con tendencia a la baja, que parece tender a estabilizarse, a lo largo de todo el periodo de estudio (2002-2018). En este último año los valores de NO_x se mantienen estables; igualmente y en todos los casos los valores están por debajo del límite de calidad del aire (200 µg/m³).

2.4. Partículas – PM₁₀ y PM_{2,5}

Las concentraciones de partículas en el aire se miden actualmente sobre todo en forma de PM₁₀, concentración másica de partículas de diámetro aerodinámico equivalente inferior a 10µm, que pueden entrar en el sistema respiratorio. Otras fracciones de tamaño de partículas que afectan la salud, como las PM_{2,5}, se miden ya en las estaciones de vigilancia de las Centrales Térmicas de cara al cumplimiento de la nueva Directiva de Calidad del Aire y se han medido desde el año 2009 en la estación de La Cigüeña con el

Gobierno de La Rioja

método gravimétrico de referencia. Estas últimas mediciones requieren una analítica mucho más compleja que la de los analizadores fijos.




Gráfico 9.- Media anual PM₁₀. – Protección de la salud humana.




Gráfico 10.- 36º valor más alto PM₁₀ en todas las estaciones.

En las gráficas anteriores se observa que los valores se mantienen estables sobre los niveles de años anteriores en la zona urbana y rural y con ligera tendencia al alza en la zona urbana, tanto en los valores medios como en la representación de los valores del percentil correspondiente (36º valor más alto de PM₁₀).

Estos resultados se obtienen teniendo en cuenta la media de los valores medios y la media de los percentiles de todas las estaciones que sirven para la evaluación de la zona a la que pertenecen, es decir, en el caso de la zona rural, de las estaciones de Alfaró, Arrúbal, Galilea y Pradejón, por este motivo las conclusiones pueden ser distintas a las obtenidas de la evaluación de los valores máximos de las estaciones de la zona rural.

Gobierno de La Rioja

Por ello, para la zona rural resulta más interesante, a efectos también prácticos para la evaluación de la calidad del aire, la revisión de los valores máximos en cada zona (que en la zona urbana no cambiaría ya que sólo se evalúa mediante los datos de una estación y en la zona rural sería el valor del percentil de la estación con los parámetros más desfavorables). A continuación se representan los valores más desfavorables de la zona rural para compararlos con los valores medios de percentil representados en la gráfica 11.




Gráfico 11.- 36º valor más alto PM₁₀ en todas las estaciones tomando los valores más desfavorables de las estaciones.

Como se observa, en la zona rural y tomando el valor más desfavorable, los valores se mantienen alejados del valor límite. Por otra parte, cabe indicar, que estos resultados, en virtud de las Directivas Europeas, se han realizado aplicando los descuentos de los días con superaciones debidos a causas naturales, los cuales suponen entre 1 y 2 µg/m³ de incremento de la media anual en La Rioja

La información para el descuento es suministrada por el Ministerio competente en Medio Ambiente y se realiza tomando como estación de fondo para el descuento la estación de Valderejo.

En cuanto a las partículas PM₂₅, el valor límite promedio en un año civil, en condiciones ambientales para la protección de la salud es de 25 µg/m³ y según se indica en el Anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, hay un valor límite indicativo para la fecha 1 de enero de 2020 de 20 µg/m³, que deberá ratificarse.

Las medias anuales se mantienen por debajo de dichos valores límite, como se aprecia en la siguiente tabla:

Estaciones	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
La Cigüeña		12,9	6,4	11,4	10,5	9,0	13,7	12,2	11,9	11,9	9,9
Alfaro	12,7	15,2	11,7	12,7	9,9	8,3	8,4	6,4	6,1	6,4	7,2
Arrúbal	8,4	7,7	10,4	9,1	10,8	8,2	9,1	10,0	11,2	8,0	7,6
Galilea	7,9	9,6	9,2	10,0	9,4	8,0	8,9	8,9	8,7	8,2	7,9
Pradejón	7,5	6,9	7,2	8,3	8,0	7,9	8,7	7,5	7,2	6,3	11,3

Tabla 9: Valores promedio anuales de PM₂₅ en un año civil

Gobierno de La Rioja

2.5. Monóxido de Carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas inflamable, incoloro, insípido, ligeramente menos denso que el aire y altamente tóxico. El CO se genera naturalmente en la producción y degradación de la clorofila de las plantas, así como en los incendios forestales al producirse combustión incompleta del carbono. También se origina por la oxidación atmosférica del metano procedente de la fermentación anaerobia de la materia orgánica.

Entre los orígenes antropogénicos destacan los procesos de combustión, siendo la combustión incompleta de carburantes en los automóviles la causa principal de los problemas por contaminación de CO, así como la combustión incompleta en focos fijos (calefacciones, industrias) y en la incineración de residuos.

Este gas representa una gran amenaza para la salud por su capacidad de reaccionar con la hemoglobina de la sangre en competencia con el oxígeno (posee unas 240 veces más afinidad por la hemoglobina que el O₂) formando carboxihemoglobina, que reduce la capacidad de la sangre para el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos.




Gráfico 12.- Valor medio CO.- Protección de la salud humana.




Gráfico 13.- Máximo octohorario de CO.

El valor más alto de CO se ha calculado a partir de la media octohoraria máxima correspondiente a cada día. Para el cálculo de la media octohoraria se utilizan las medias móviles de ocho horas, calculadas a partir de datos horarios, que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria calculada se atribuirá al día en que termine el período, es decir, el primer período de cálculo para cualquier día dado será el período

Gobierno de La Rioja

que comience a las 17:00 de la víspera y termine a la 1:00 de ese día; el último período de cálculo para cualquier día dado será el que transcurra entre las 16:00 y las 24:00 de ese día.

Los valores de CO para todas las estaciones y en todos los casos son muy bajos y continúan en 2018 con la tendencia estable tanto en la zona urbana como en la zona rural. Para el caso de los máximos octohorarios los valores de la aglomeración urbana y de las zonas rurales están muy por debajo del valor límite.

2.6. Benceno

El Benceno presente en la atmósfera procede principalmente de emisiones provocadas por la actividad humana en las ciudades. La fuente más común es el uso del tráfico urbano, la evaporación de gasolinas y gasóleos durante las operaciones de llenado de combustible, la producción de diferentes compuestos químicos, las emisiones procedentes de la combustión incompleta del carbón y de productos derivados del petróleo, y la manufactura de pinturas o su utilización por cualquier tipo de industria. También se han detectado emisiones de este compuesto en vertederos de residuos sólidos de media y alta densidad.

El Benceno forma parte de los denominados Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): compuestos químicos de estructuras diversas, formados principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida por otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre, que debido a su baja presión de vapor, dan lugar a concentraciones importantes en el aire (de acuerdo con los criterios más ampliamente aceptados, en el término Compuestos Orgánicos Volátiles no metánicos se agrupan todas aquellas sustancias de base carbono presentes en la atmósfera distintas del metano, que tengan una presión de vapor superior a 0,14 mm de Hg a 25°C. Generalmente tienen un número de átomos de carbono entre 2 y 12). Algunos COV, junto con los óxidos de nitrógeno, son capaces de producir oxidantes fotoquímicos cuando reaccionan en presencia de luz solar, siendo estos precursores del ozono.

En la estación de La Cigüeña, en la aglomeración urbana de Logroño, se miden además del Benceno, los niveles de Tolueno y Xileno, completando de esta manera la evaluación de los compuestos orgánicos volátiles en el aire. No obstante, hasta el momento, solo el Benceno tiene establecido un valor límite de concentración de 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. En el caso del tolueno, se origina predominante por el uso de disolventes, pinturas y adhesivos, destaca por el importante descenso que ha tenido en los últimos años, al igual que el Xileno.




Gráfico 14.- Media anual BTX en Logroño.

Tal y como se observa en el **gráfico 15**, los valores medios de Benceno no han sufrido una variación importante en el año 2018 en la aglomeración urbana; en todo caso están muy por debajo del límite indicado en la normativa.

Gobierno de La Rioja




Gráfico 15.- Media anual de Benceno en Logroño.

2.7. Ozono

La mayor parte del ozono presente en la atmósfera, en torno a un 90%, se encuentra en la estratosfera. Cuando se forma en la baja troposfera (capa más baja de la atmósfera) se denomina ozono troposférico y se considera un contaminante secundario de origen fotoquímico, pudiendo originar problemas en la salud, sobre todo en ciertos sectores sensibles, causando irritación en los ojos, nariz y garganta. Así, se han establecido relaciones entre la frecuencia de crisis de asma y los días de concentraciones elevadas de ozono y otros oxidantes fotoquímicos pues, al parecer, provoca una disminución de las funciones pulmonares. Los daños que provoca son extensibles también a la vegetación y a los materiales.

En el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, se establecen los valores de referencia aplicables a este contaminante en aire ambiente:

- **UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN : 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, registrado como promedio de una hora**
- **EL UMBRAL DE ALERTA A LA POBLACIÓN: 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, registrado como promedio de una hora**

En una superación del umbral de información en cualquiera de las estaciones de La Rioja, se desata un protocolo de actuación a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y el Servicio de Protección Civil por el cual se suministra la siguiente información a medios de comunicación y organismos públicos interesados:

- 1) Información sobre la superación o superaciones observadas: Situación o área de las superaciones. Tipo de umbral superado (de información o de alerta). Hora de inicio y duración de la superación. Concentración máxima de las medias horaria y octohoraria.
- 2) Previsión para la siguiente tarde/día: Área geográfica en la que se espera la superación del umbral de información o alerta. Evolución prevista de la contaminación (mejora, estabilización o empeoramiento).
- 3) Información sobre el tipo de población afectado, los efectos posibles sobre la salud humana y las precauciones recomendadas: Información sobre los grupos de riesgo de la población. Descripción de los síntomas más probables. Precauciones recomendadas para la población afectada. Fuentes de información adicional.
- 4) Información sobre las medidas preventivas para reducir la contaminación o la exposición a ésta: Indicación de los principales sectores emisores; medidas recomendadas para reducir las emisiones.

Gobierno de La Rioja




Gráfico 16.- Media anual de O₃.




Gráfico 17.- 26º valor máximo de O₃.

Teniendo en cuenta los valores medios y la media de los percentiles para la representación de cada zona, se observa que en la zona urbana los valores de ozono se mantienen bastante estables en los valores de los últimos años y por debajo de valores límite desde el año 2006. En este último año 2018 y para la zona rural, se observa en la **gráfica 17** del 26º valor máximo de ozono que, se ha registrado un valor en este último año, similar al del año anterior y que los niveles medios que anteriormente llegaron a rebasar los valores límite de calidad del aire, siguen manteniéndose por debajo de dicho valor.

En la tabla 9 se pueden apreciar los datos numéricos de las superaciones anuales y del número de superaciones medio en tres años del umbral de protección de la salud (120 µg/m³). La media de los tres últimos años no debe rebasar el valor límite establecido en la normativa (25 superaciones del valor 120 µg/m³, como media de tres años). En la zona rural se observan una variación dispar del número de superaciones del umbral de protección de la salud en el año 2018, con respecto a 2017. La media de los tres años evaluables da valores por debajo del umbral en todas las estaciones.

Nº de superaciones del valor máximo octohorario diario cada año ³					
Estación	2016	2017	2018	Años evaluables	Media de 3 años evaluables
La Cigüeña	0	0	2	2016;2017;2018	1
Alfaro	12	11	15	2016;2017;2018	13
Arrúbal	0	0	7	2016;2017;2018	2
Galilea	8	8	2	2016;2017;2018	6
Pradejón	0	14	5	2016;2017;2018	6
Máximo	12	14	15		13

Tabla 9.- Superaciones por año y como promedio de los últimos años de ozono en la estación de La Cigüeña y en las zonas rurales tomados como máximas rurales.

³ Resultados según evaluación de los datos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a partir de los valores suministrados por la [Dirección General de Calidad Ambiental y Agua](#).

Gobierno de La Rioja

Como ya se ha comentado, en 2018 no se produjeron superaciones del umbral de información de ozono ($180\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Paralelamente, y desde la entrada en vigor del Real Decreto 1796/2003 además se aplican nuevos indicadores de referencia, entre ellos la AOT40, calculada como la suma de las diferencia entre las concentraciones horarias superiores a $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ a lo largo del periodo de mayo a julio utilizando los valores horarios comprendidos entre las 08:00 y las 20:00 (hora central europea).

En la **gráfica 18** se ha representado el valor AOT como promedio de 5 años, ya que el valor límite indicado en el RD 1796/2003 es $18000\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$ de promedio en un periodo de 5 años (se han realizado los cálculos con todos los datos disponibles).

AOT 40V Datos MARM.			
Estaciones	Dato 2018	Media 5 años	Periodo evaluable
La Cigüeña	7.443	4.670	2014-2018
Arrúbal	13.808	8.576	2014-2018
Pradejón	12.631	9.853	2014-2018
Galilea	10.399	7.176	2014-2018
Alfaro	17.731	15.341	2014-2018

Tabla 10.- Valores AOT anuales y valores promedio de un periodo de 5 años.

Tal y como se observa en la **gráfica 18**, los valores AOT40 para la zona urbana y la rural se encuentran por debajo del valor límite desde el año 2006, aunque mas marcadamente en el caso de la zona urbana.




Gráfico 18.- Valor AOT40 de O_3 promedio de 5 años. Protección de los ecosistemas.

Gobierno de La Rioja

RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE LA RED AUTONÓMICA DE BIOMONITORIZACIÓN DE METALES PESADOS EN LA RIOJA (RABMPLR).

Desde la implantación de la red autonómica de biomonitorización en el año 2006 se han completado seis campañas de muestreo, análisis e interpretación de los resultados. La primera de ellas se realizó mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja; para las campañas sucesivas contrató a la Fundación General de la Universidad de La Rioja.

Durante todas las campañas, desde 2006 hasta 2018, la Universidad de La Rioja se ha encargado del programa de muestro y el equipo de la Universidad de Santiago de las determinaciones analíticas.

- Campaña 1: periodo 2006-2007.
Se estableció la red básica de muestreo, con un mallado de 25 puntos, y se estudiaron los datos de análisis de las muestras para determinar los niveles de fondo regionales.
- Campaña 2: periodo 2008-2009.
Se utilizó la misma red básica. En ésta y en las sucesivas campañas, el primer año se realizaban los muestreos de época húmeda y época seca en los diversos puntos, la preparación de muestras y el envío al laboratorio; y el segundo año se procesaban los resultados y se elaboraba el informe final de presentación de datos y conclusiones.
- Campaña 3: periodo 2010-2011.
Se utilizó la misma malla, pero ampliada en el entorno del punto de muestreo de Alfaro para definir mejor una anomalía encontrada para el arsénico.
- Campaña 4: periodo 2012-2013.
Se utilizó una malla similar a la de 2010-2011, manteniendo un punto adicional en el entorno de Alfaro y ampliando el mallado hacia el este con otras tres estaciones, intentando precisar el origen de la anomalía detectada para el arsénico.
- Campaña 5: periodo 2014-2015.
Se volvió a utilizar la red básica de 25 puntos.
- Campaña 6: periodo 2016-2017.
Se mantuvo la red básica de 25 puntos y se amplió la analítica de las muestras a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el nitrógeno.
- Campaña 7: periodo 2018-2019.
Se emplea la malla básica de 25 puntos y se han añadido biomonitores de musgo clonado Mossphere® junto a las cinco estaciones automáticas de análisis de calidad del aire. En esos cinco puntos de musgo clonado Mossphere® y en cinco puntos correlacionables de musgo natural se analizarán, además de los metales, el nitrógeno total y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

Como resultados principales se tiene:

- Campaña 2006-2007.
Los primeros resultados obtenidos durante la mostraron unos niveles bajos de arsénico, cadmio, mercurio y plomo, pero plantearon cierta incertidumbre en cuanto al níquel.
- Campaña 2008-2009.

Gobierno de La Rioja

Se observaron niveles bajos de todos los metales pesados, con un notable descenso de los niveles de níquel respecto a los del 2007. En un punto se observó que se registraban niveles de arsénico por encima de los niveles de fondo, aunque notablemente por debajo del umbral inferior de la calidad del aire ambiente; no obstante la calidad del aire con respecto al arsénico era muy buena en el 92% del territorio estudiado.

- Campaña 2010-2011.

Los valores siguieron siendo bajos en cuanto a cadmio, mercurio, plomo y níquel. Se observó, con las matizaciones recogidas en la memoria, un ligero descenso en la concentración de cadmio mercurio y plomo, y un ligero aumento del níquel. En cuanto al arsénico las muestras tomadas en las estaciones complementarias confirmaron la existencia de la anomalía y un aumento generalizado de los niveles, pero dentro de los niveles bajos y por debajo del umbral inferior de calidad en el 96% del territorio. En una de las estaciones adicionales se superó el umbral superior de calidad, sin alcanzar el valor límite. El informe final recomendó el seguimiento y la ampliación de la red hacia el este.

- Campaña 2012-2013.

Se constató que no existía en todo el territorio estudiado contaminación apreciable de cadmio, mercurio y plomo, con concentraciones por debajo del umbral inferior de calidad del aire e incluso por debajo del nivel de fondo. El níquel presentaba valores algo más elevados y de difícil correlación. En cuanto al arsénico, dos estaciones de la red básica superaron el umbral inferior, siendo el caso de Alfaro persistente. Además, se demostró que el foco de arsénico de la zona Alfaro-Tudela debía ser puntual. En todo caso, el 92% de la zona muestreada tenía calidad muy buena para el arsénico y las concentraciones más elevadas encontradas no parecían preocupantes para la salud humana ni la de los ecosistemas. El informe final recomendaba mantener la RABMPLR, dejando únicamente las 25 estaciones básicas de la malla de 25 km de lado.

- Campaña 2014-2015.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la calidad del aire era muy buena con respecto a los cinco elementos estudiados (As, Cd, Hg, Ni y Pb) en el 100% del territorio muestreado.

- Campaña 2016-2017.

Se llevó a cabo una nueva campaña de muestreo integrada en los programas europeos *Heavy Metals in Mosses Survey* e *ICP-Vegetation*, incluyendo entre los contaminantes el nitrógeno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).

En cuanto a los metales pesados, los resultados de la campaña indicaron que la Comunidad Autónoma de La Rioja presenta una calidad del aire muy buena respecto de As, Hg, Ni y Pb en el 100% del territorio muestreado. En el caso del Cd, el 88% del territorio (22 de las 25 estaciones) muestra una calidad del aire muy buena, con concentraciones por debajo del umbral inferior de calidad, mientras que una estación se encuentra entre los umbrales inferior y superior de calidad y dos más están entre el umbral superior de calidad y el valor límite. Dado que en ningún caso se supera el valor límite, esas concentraciones no suponen riesgo para la salud de las personas ni de los ecosistemas, pero sí se recomendaba vigilar el cadmio en las campañas sucesivas, por haberse detectado una subida generalizada, y a que se podría estar asistiendo a la puesta en actividad de un foco de cadmio que entraría en la RABCALR por el noroeste.

En cuanto al nitrógeno, la campaña 2016-2017 mostró gran estabilidad temporal respecto a las mediciones de la campaña 2010-2011, con contenidos bajos en comparación con las encontradas en otros países europeos y sin mostrar un patrón espacial claro. La relación isotópica $\delta^{15}\text{N}$ varió de modo similar a 2010-2011 y tampoco mostró un patrón espacial claro.

Gobierno de La Rioja

En cuanto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) según los datos de la campaña de 2016-2017 la toxicidad debida a HAP en la RABCALR es muy baja o inexistente, con concentraciones muy bajas en comparación con otros territorios. El valor máximo de HAP se encontró en un punto fuera de la comunidad autónoma, relacionado con un gran incendio forestal.

- Campaña 2018-2019:

Se trata de una campaña en curso en la que se emplea la misma malla básica de 25 puntos y se han añadido biomonitores de musgo clonado Mossphere® junto a las cinco estaciones automáticas de análisis de calidad del aire. En los cinco puntos de musgo clonado Mossphere® y en cinco puntos correlacionables de musgo natural se analizarán, además de los metales, el nitrógeno total y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) al objeto de avanzar en la determinación de la relación entre ambas metodologías. El informe de conclusiones se recibirá en 2019.

Estudio de biomonitorización de la contaminación por metales pesados en el área metropolitana de Logroño

Complementariamente a la RABCALR, gracias a un convenio con la Fundación La Caixa, en diciembre del año 2017 se procedió a contratar la realización a lo largo de 2018 de trabajos más específicos de biomonitorización del contenido de metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y nitrógeno en el área metropolitana de Logroño, empleando para ello biomonitores de musgo transplantado Mossphere® y ejemplares ornamentales de Aligustre (*Ligustrum*).

El estudio fue realizado por investigadores del Grupo de Ecofisiología Vegetal, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Grupo de Ecotoxicología de la Universidad de Santiago de Compostela.

La previsión inicial era utilizar 50 esferas de musgo (Mossphere®), pero se aumentó el número para incrementar la solidez estadística del estudio. La malla de muestreo final constaba de 84 esferas ubicadas en una malla regular de 575 metros de lado que cubría la ciudad de Logroño y su zona periurbana inmediata. Las muestras en aligustre se recolectaron en 50 árboles del casco urbano de Logroño, en una malla irregular de aproximadamente 500 metros de lado. Además, en los aligustres se midieron tres variables fisiológicas no destructivas: rendimiento cuántico máximo del fotosistema II (Fv/Fm) y contenido en clorofilas y flavonoides; que permiten evaluar los daños producidos en las hojas por la exposición a las condiciones ambientales y, presumiblemente, a los contaminantes.

Con este estudio pionero se ha comprobado la utilidad de las técnicas de biomonitorización para conocer la calidad del aire urbano y periurbano y se ha podido zonificar la ciudad de Logroño y su entorno periurbano en función de los niveles de los contaminantes analizados, constatando que los dispositivos Mossphere® son mejores biomonitores que las hojas de aligustre.

Los parámetros analizados han sido:

- Metales: As, Cd, Hg, Ni, Pb, Cu, Sb, Pt, Pd, Rh, V,
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos: Acenafteno (Ace), Antraceno (Ant), Benzo[a]antraceno (BaAnt), Benzo[a]pireno (BaPyr), Benzo[b+j]fluoranteno (BbjFl), Benzo[ghi]perileno (BghiPer), Benzo[k]fluoranteno (BkFl), Criseno (Chr), Fluoreno (F), Fluoranteno (Fl), Indeno[1,2,3- cd]pireno (Ipyr), Naftaleno (NA), Fenantreno (P), Pireno (Pyr), Dibenzo[a,h]antraceno (DBahAnt) y Acenaftileno.
- Nitrógeno.

Con el estudio se ha podido determinar que:

Gobierno de La Rioja

- Las concentraciones de contaminantes obtenidas han sido relativamente bajas y el territorio estudiado carece de fuentes de contaminación severa. Se han detectado focos difusos de contaminación en los Polígonos Industriales de Cantabria y La Portalada debido principalmente al tráfico y las actividades industriales.
- Los metales medidos en los dispositivos Mossphere® en estaciones situadas en los Polígonos Industriales de Cantabria y La Portalada mostraban tasas más altas de enriquecimiento en todos los elementos analizados. Otras estaciones ubicadas cerca de carreteras (especialmente vías grandes como la circunvalación sur de Logroño) y aparcamientos también estaban enriquecidas en varios elementos, mientras que el casco urbano mostraba en general bajas tasas de enriquecimiento.
- En cuanto a la biomonitorización de HAP con Mossphere®, aunque aún no se puede comparar directamente la calidad del aire de Logroño y su área metropolitana con la de otros lugares, las tasas de enriquecimiento obtenidas apuntan a que la contaminación es pequeña. Sí que se ha podido zonificar el territorio estudiado en áreas más y menos enriquecidas de contaminantes; y entre las primeras destacan, como en el caso de los metales pesados, los Polígonos Industriales de Cantabria y La Portalada.
- Se ha comprobado la utilidad del aligustre como biomonitor de metales pesados, aunque los resultados parecen menos sólidos que en el caso de las Mossphere® porque la distribución de los aligustres no incluía las zonas más enriquecidas en contaminantes detectadas con las Mossphere® (polígonos industriales de Cantabria y La Portalada). En general, los árboles enriquecidos estaban situados más frecuentemente en las zonas periféricas de la ciudad que las zonas interiores, y había ejemplares enriquecidos en varios elementos a la vez
- Como ocurre con los metales pesados, aún no existen datos comparativos de biomonitorización de HAP con hojas de aligustre en otras ciudades, por lo que no se puede comparar la calidad del aire de Logroño y su área metropolitana en relación con otros lugares; no obstante, las concentraciones obtenidas apuntan a que la contaminación es pequeña.
- Se ha podido valorar el potencial del aligustre como filtro verde, capaz de retirar contaminantes de la atmósfera.

Además, el trabajo realizado:

- Ayuda a planificar las actuaciones para conservar y mejorar la calidad del aire en entornos urbanos y periurbanos ya que permite zonificar y sectorializar los espacios en función de esa calidad
- Abre perspectivas de encontrar umbrales de riesgo y definir intervalos de seguridad, relacionando las concentraciones de contaminantes medidas en los biomonitores y el aire. La ampliación de este tipo de investigaciones desde una perspectiva multidisciplinar, incluida la sanitaria-epidemiológica, permitiría relacionar las concentraciones de contaminantes medidas en los biomonitores con los efectos potencialmente nocivos que la presencia de esos contaminantes en el aire puede tener sobre la salud de las personas y el resto de seres vivos que habitan las ciudades y sus entornos periurbanos.