

Cantharellus lutescens Pers.: Fr.

Angula de monte

Esta bonita y llamativa especie crece en otoño generalmente, bajo coníferas, formando grandes colonias en las zonas frescas y musgosas. Bastante común en general, en La Rioja y en los bosques de pino silvestre del Parque.



Bajo *Pinus sylvestris*, Lumbreras, octubre de 2004.

Sombbrero: de 2 a 5 cm de diámetro, deprimido, umbilicado o embudado, en forma de trompeta. Margen ondulado, sinuoso, incurvado. Cutícula adherida, rugosa, fibrilar, de color pardo anaranjado, marrón amarillento o dátil.

Himenio: formado por pliegues decurrentes a modo de venas o arrugas, bajos, anastomosados y bifurcados o ramificados, decurrentes al pie. De color amarillo vivo o anaranjado. Esporada crema amarillenta.

Pie: de 3-6 x 0,3-0,8 cm, atenuado o sinuoso, comprimido o surcado longitudinalmente, hueaco. Superficie lisa, en los colores del himenio o más pálidos hacia la base.

Carne: delgada fibrosa o algo elástica y tierna. De color amarillento pálido. Olor agradable, afrutado y perfumado o como a ciruelas; sabor suave, dulce. No suele estar invadida por larvas de insectos.

MICROSCOPIA: esporas anchamente elipsoides, lisas, hialinas, no amiloides ni dextrinoides, de 9-12 x 6,5-8,5 μm . Basidios alargados, tetraspóricos en mayoría. Hifas fibuladas.

CONFUSIONES: la variedad *lutescens* de *Cantharellus tubaeformis*, presenta un colorido general amarillo y los pliegues del himenio son más destacados. También se pueden parecer otras especies del género o de la familia, pero todas ellas son comestibles.

VALOR CULINARIO: muy buen comestible. Bien conocido por los aficionados. Es objeto de comercio.