

Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Singer

= *Collybia velutipes* (Curtis: Fr.) P. Kumm.

Crece cespitosa, formando ramilletes, sobre madera de arbustos o árboles viejos, principalmente planifolios. A veces esos restos de madera están enterrados y aparentan nacer sobre la tierra. Aparece a finales del otoño, soporta bien las heladas y llega a estar presente hasta la primavera. Se cultiva y comercializa de forma industrial sobre sustrato de serrín. No es muy frecuente en La Rioja y tampoco en el Parque.



Sobre ramas secas de arbusto sin identificar, a orillas del río Iregua, El Achichuelo, Villoslada de Cameros, febrero de 2007.

Sombrero: de 2 a 6 cm de diámetro. Poco carnoso, inicialmente convexo, acampanado y posteriormente aplanado. Cutícula lisa, muy viscosa en tiempo húmedo. Es de color anaranjado, amarillo miel, más oscuro hacia el centro, con el margen liso y delgado.

Pie: de 4–8 x 0,3–0,6 cm, cilíndrico, generalmente curvado. Cubierto por un fino terciopelo muy característico. Amarillo pálido en la parte alta y pardo negruzco hacia la base.

Himenio: láminas adheridas, escotadas o casi libres al pie, desiguales, anchas y distanciadas entre sí. De color crema ocre. Esporada blanca.

Carne: delgada y blanda. De color blanquecino amarillento. Sabor suave, agradable y olor aromático fino, casi inapreciable.

MICROSCOPIA: esporas de 5–9 x 3,5–5 μm , lisas, subelipsoides, no amiloides. Basidios claviformes, tetraspóricos, de 30–40 x 5–7 μm . Dermatoconidios fusiformes. Epicutis gelatinizada, con hifas sinuosas, ramificadas y entremezcladas. Hifas fibuladas.

CONFUSIONES: se le puede parecer *Hypholoma fasciculare*, que tiene un sombrero amarillo vivo o anaranjado, pero las láminas son de color pardo verdoso y el pie es amarillo y liso; además su sabor es muy amargo.

VALOR CULINARIO: comestible. Se cultiva y vende en los mercados.