

Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel

Boleto pegajoso

Es una seta que micorriza con diversos tipos de pinos. Es muy común y abundante en La Rioja y en el Parque. Aparece desde finales de la primavera hasta el otoño.



Hayedo con pinos aislados, El Achichuelo, Villoslada de Cameros, julio de 2006.

Sombbrero: de tamaño variable, entre 4 y 14 cm. Al principio hemisférico pasando a convexo y posteriormente aplanado, con protuberancias y depresiones. La cutícula es viscosa, lisa y brillante; se separa completamente de la carne. De color ocre con tonos marrones amarillentos a marrones rojizos.

Himenio: formado por tubos cortos, de 1 a 1,5 cm, adheridos y algo decurrentes, fácilmente separables de la carne. De color amarillo cremoso de jóvenes pasando luego a pardo oliváceo. Los poros, pequeños y redondeados, son del mismo color que los tubos y en su juventud exudan unas gotas de líquido con textura lechosa que oscurece cuando se seca. Esporada parda, ligeramente olivácea.

Pie: de 4-12 x 1-2 cm, cilíndrico, a menudo curvado y algo engrosado en la base. Tiene color amarillo crema con granulaciones amarillas más notables en la parte superior; que con el tiempo pasan a color pardo.

Carne: inicialmente firme pero rápidamente se ablanda. De color blanquecino a amarillento pálido. Con olor poco apreciable y sabor suave y dulce.

MICROSCOPIA: basidios de 20-30 x 5-7 μm , que portan cuatro esporas fusiformes y lisas de 8-11 x 3-4,5 μm . Sin fíbulas entre las hifas.

CONFUSIONES: *Suillus collinitus* presenta la base del pie rosada por el micelio. En *Suillus mediterraneensis* la carne es de color amarillo intenso. *Suillus bellinii* tiene el sombrero de colorido blanquecino o sucio.

VALOR CULINARIO: comestible. Debemos elegir ejemplares jóvenes y retirarles la cutícula y los poros antes de su consumo, para evitar en lo posible el efecto laxante que poseen.