

Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel

= *Boletus luteus* (L.: Fr.) Quél.

Boleto viscoso - Boleto anillado

Boletácea que micorriza diversas especies de coníferas. Muy frecuente en general; también es abundante y frecuente en los pinares del Parque.



Villoslada de Cameros, bajo Pinus sylvestris, noviembre de 2005.

Sombbrero: hasta 12 cm, primero hemisférico o algo cónico, después convexo y al final extendido y un poco mamelonado. Cutícula separable, lisa, muy viscosa, de color marrón achocolatado, cubierta de una capa de mucílago de tonos violáceos.

Himenio: presenta poros estrechos, angulosos, amarillos e inmutables al tacto. Los tubos son adherentes, de color amarillo limón al principio, luego parduscos. Esporada marrón canela.

Pie: hasta 10 X 2,5 cm, cilíndrico, con gránulos por encima del anillo y escamas pardas por debajo. Micelio blanquecino. Presenta un anillo amplio, membranoso, viscoso, de color blanco y violáceo que desaparece en tiempo seco y en los ejemplares adultos.

Carne: blanquecina o amarillenta de sabor y olor agradables, afrutados.

MICROSCOPIA: esporas fusiformes, de 7-10 X 3-4 μm . Basidios de 20-26 X 5-7 μm , claviformes, tetraspóricos. Cistidios de hasta 50 X 8 μm . Epicutis en ixocutis con hifas de 2-6 μm . Fíbulas ausentes.

VALOR CULINARIO: comestible bueno para algunos, laxante y problemático para otros. Se recomienda consumirlos jóvenes una vez eliminada la cutícula y el himenio.

CONFUSIONES: fácil de reconocer por su anillo, que lo diferencia de otros *Suillus*.