

FAUNA AMENAZADA DE LA RIOJA

ÁGUILA PERDICERA

Nombre científico: *Hieraetus fasciatus* Nombres comunes:
 Vieillot, 1822 Español: Águila - azor perdicera
 Clase: Aves Inglés: Bonelli's Eagle
 Orden: Falconiformes Alemán: Habichtsadler
 Familia: Accipitridae

Descripción:
 Longitud de 65 a 73 cm. Envergadura de 150 a 180 cm. Peso entre 1.600 y 2.500 g. Hembra mayor que el macho. Color pardo oscuro con rémiges negras. El pecho suele ser muy claro, casi blanco. Los inmaduros presentan en la parte inferior del cuerpo tonos pardos rojizos. Tiene plumas hasta los tarsos y fuertes garras.

Comportamiento:
 Vuelo rápido y vigoroso. Planea frecuentemente, muchas veces en pareja, manteniendo las alas casi horizontales y realizando fuertes picados. Puesta anual de dos huevos. En épocas de escasez de alimentos, el pollo más pequeño puede morir. Los jóvenes se acercan a zonas más mediterráneas donde la abundancia de presas es mayor. Cuando alcanzan la madurez, a los tres años, tienden a regresar a sus lugares de origen (tendencia filopátrica).

Hábitar:
 Cantiles, cortados y farallones rocosos de montañas medias mediterráneas. Nidifica en repisas, grietas y cuevas inaccesibles. El nido puede superar el metro y medio de diámetro. Su estructura se compone de ramas secas, con una cubeta forrada con hojas que renueva con regularidad.

Población en España y en La Rioja:
 Esta especie está experimentando un declive generalizado en toda la Península, y ha desaparecido en torno al 15 o 20% durante los años 80. La población española se calcula en la actualidad en unas 750 parejas, lo que supone el 75% de la población europea. La población de La Rioja es de cuatro parejas.

Status de Conservación:
 Especie protegida. En España está clasificada como "vulnerable"; en La Rioja "en peligro de extinción". Se ha promulgado, en La Rioja el Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera, (Decreto 19/ 1999 del 28 de mayo).

Amenazas:
 Electrocutación y colisión en tendidos eléctricos.
 Persecución directa (caza furtiva, veneno y destrucción de nidos).
 Alteración del medio y realización de actividades molestas en los lugares de nidificación.
 Disminución de las poblaciones de presas.

Medidas de Conservación:
 Adecuación de los tendidos eléctricos con riesgo de electrocutación y colisión.
 Control de las actividades cinegéticas próximas a sus áreas de cría.
 Conservación del hábitar, protección y restricciones de acceso a sus áreas de cría.
 Fomento de sus presas potenciales mediante la mejora de su hábitar.

Se ha puesto en marcha un programa Life-Naturaleza de la Unión Europea para la recuperación del Águila-azor perdicera.

FASES DEL PLUMAJE



Pollo de días




Pollo de 1 mes




Pollo plumándose (casi voladero)


Joven del año



Adulto (más de 3 años)



DISTRIBUCIÓN



ALIMENTACIÓN



CICLO VITAL



TÉCNICAS DE CAZA



COMPETIDORES



CAUSAS DE REGRESIÓN

Tendidos eléctricos, molestias en época de cría, pistas y carreteras en zonas de nidificación, destrucción del medio (canteras, aterrazamientos...) y caza furtiva.

