

Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer ex Donk

= *Tricholoma georgii* (Clus.: Fr.) Quél.

Fina - Seda

Especie frecuente en general, también en La Rioja y en el Parque. Habita en praderas, setos o lugares herbosos. Crece en primavera formando hileras o corros de brujas; excepcionalmente, se han recolectado algunos ejemplares en otoño. Bien conocida por los aficionados y muy buscada para su consumo y venta.



Pradera, Villoslada de Cameros,
mayo de 2004.

Sombbrero: de 4 a 12 cm de diámetro, inicialmente globoso, luego convexo y aplanado al final. Margen enrollado en ejemplares jóvenes, luego incurvado y, al final, extendido. Cutícula separable, mate, seca o un poco húmeda, de color blanco, blanquecino o cremoso.

Himenio: láminas subadheridas, escotadas, desiguales, estrechas y apretadas. De color blanco o blanquecino. Esporada blanquecina a crema pálida.

Pie: de 4-8 X 1,5-2,5 cm, robusto, cilíndrico o engrosado en la base, lleno. Superficie seca, lisa o con finas fibrillas. De color blanco o blanquecino.

Carne: abundante, compacta y tierna, blanca. Olor y sabor fuertes y agradables, harinosos aromáticos, distintivos.

MICROSCOPÍA: esporas de elipsoides a cilíndricas, lisas, hialinas, no amiloides, de 4,5-6,5 x 2,5-3,5 μm . Basidios claviformes, tetraspóricos. Sin cistidios. Con fibrillas.

CONFUSIONES: las posibilidades de confusión son muy escasas debido a los lugares y la época de aparición principalmente. No obstante, algunas especies blancas del género *Melanoleuca* pueden parecerse a simple vista.

VALOR CULINARIO: buen comestible. Parece poseer efectos hipoglucémicos. Es objeto de una intensa búsqueda en nuestra Comunidad, tanto por los aficionados riojanos como de otras regiones, por lo que **convendría protegerla** o regular su recolección de alguna manera.