

Hydnum repandum L.: Fr.

Lengua de vaca

Crece formando corros y en grandes cantidades en los bosques de planifolios y coníferas, con clara preferencia por los hayedos. Sale desde el inicio del verano, hasta bien entrado el otoño.



Peña Hierre (Lumbreras), en coníferas (*Pinus sylvestris*).

Sombbrero: de 4 a 15 cm, convexo, luego aplanado, giboso y muy irregular; a veces deforme, con el margen grueso, ondulado e incurvado. La cutícula es lisa, seca, mate y pulverulenta o aterciopelada. De color crema amarillento, con zonas que pueden tomar tonos naranja. Es muy carmoso, compacto, duro y quebradizo. En ocasiones podemos encontrar varios ejemplares juntos que han fusionado sus sombreros.

Himenio: conformado por agujones de color blanco-crema, algo más claros que el sombrero. Muy apretados y un poco decurrentes. Se desprenden con facilidad del sombrero. Esporada blanquecina.

Pie: de 2 a 8 cm de alto x 1 a 3 cm de diámetro, subcilíndrico, excéntrico, grueso y macizo. A menudo deforme. De color blanquecino, adquiriendo, igual que el sombrero, algunos tonos amarillentos al envejecer.

Carne: compacta, firme, fibrosa y quebradiza. De color blanco amarillento, mancha ligeramente al frotarla. Olor frutal, débil y agradable. Sabor suave, un poco amargo en los ejemplares viejos. No es frecuente encontrarla parasitada por larvas.

MICROSCOPIA: esporas de 7–9 x 6–7 μm , lisas, subglobosas, no almidoides. Basidios de 40–50 x 7–8 μm , alargados claviformes, que producen cuatro esporas. Trama monomítica, con hifas de 2–10 μm , con fíbulas.

CONFUSIONES: se le parece *Hydnum rufescens*, también comestible, que tiene un color más rojizo y los agujones no decurrentes.

VALOR CULINARIO: buen comestible. Mejor los ejemplares jóvenes pues amarga al envejecer. La textura es muy firme, característica que a algunas personas gusta más que a otras. Eliminar los agujones antes de cocinarlos.