

# *Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bres.

## Seta de marzo- Marzuelo

Poco frecuente en general, también escasa en el Parque. Habita en bosques altos de hayas o de coníferas, desde principios de febrero, cuando desaparece la nieve del invierno, hasta el mes de mayo. Muy difícil de localizar, pues crece oculto entre los restos de hojas y el musgo. Sólo detectable, en ocasiones, por la presencia de abultamientos que forman los primordios entre la hojarasca cuando nacen. Consumida habitualmente por ardillas y otros animales del bosque.



*En bosque mixto de pinos y hayas, Villoslada de Cameros. Febrero de 2007.*

**Sombbrero:** de 3 a 15 cm de diámetro, inicialmente hemisférico con el margen enrollado, luego convexo, finalmente aplanado o deprimido, con el margen extendido. Cutícula separable, seca o ligeramente tozosa en tiempo húmedo, opaca, de color inicialmente blanco cuando está enterrada, más tarde gris y finalmente gris negruzco con reflejos azulados.

**Himeno:** láminas subdecurrentes, gruesas, espaciadas, inicialmente de color blanco pasando a grisáceo finalmente. Esporada blanca.

**Pie:** de 5-8 X 2-4 cm, robusto, irregular, curvado, subcilíndrico, seco, lleno, blanco o grisáceo.

**Carne:** abundante, blanca, grisácea bajo la cutícula. Olor y sabor agradable de poca intensidad.

**MICROSCOPIA:** esporas subovoides, lisas, hialinas, no amiloides, de 6-8 X 4-6  $\mu\text{m}$ . Basidios alargados, tetraspóricos, con fíbulas.

**CONFUSIONES:** las posibilidades de confusión son bastante remotas. Es la primera seta comestible de la temporada.

**VALOR CULINARIO:** buen comestible. Intensamente buscada a pesar de su escasez y la dificultad en su localización.