

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel.

= *Rhodocybe truncata* (Quél.) Bon

Es una especie muy variable, tanto en morfología como en época de presentación, pudiendo aparecer desde la primavera hasta finales de otoño, en praderas y bosques de todo tipo. Poco frecuente en La Rioja y en el Parque.



Villoslada de Cameros, a orillas del río Iregua, en bosque con árboles de ribera. Noviembre de 2006.

Sombbrero: de 5-12 cm de diámetro. Primero convexo, luego aplanado, deprimiéndose en ocasiones. A veces puede presentar un amplio mamelón, más o menos evidente. Margen algo enrollado. Cutícula seca, ligeramente aterciopelada, cubierta por una fina pruina blanquecina. Color muy variable, en las gamas del marrón oscuro al marrón anaranjado.

Himenio: láminas apretadas, adherentes o algo decurrentes al pie, fácilmente separables de la carne. Color crema o crema rosado, oscureciéndose en la vejez. Esporada rosada.

Pie: de 3-8 x 1-2 cm, grueso, robusto, macizo, relativamente corto, cilíndrico o algo adelgazado hacia la base, blanquecino, con manchas ocráceas u ocre rosadas.

Carne: abundante, gruesa, blanquecina. Olor complejo y difícil de definir, algo harinoso, característico. Sabor harinoso.

MICROSCOPIA: esporas no amiloides, elipsoides, abolladas, de 5-6 x 4-5 micras. Basidios claviformes, tetraspóricos. Queilocistidios cilíndricos, alargados, de 20-50 x 3-6 micras. Cutícula en cutis. Fíbulas ausentes.

CONFUSIONES: Puede confundirse con especies del género *Leucopaxillus*, pero éstas presentan esporas amiloides. Podría tener cierto parecido a especies grandes del género *Clitocybe*, como *Clitocybe alexandrii* o a especies del género *Lepista*, todas ellas con morfología esporal diferente.

VALOR CULINARIO: buen comestible, muy carnoso.